

TRAVNÍ KOBERCE

Skvěle vypadající trávník, snadno a rychle



TRAVNÍ KOBEREC

- Slupování již po 10-12 měsících od výsevu v trávnickové školce
- Role 40x125cm (2ks=1m²)
- 1 role cca 10-13kg
- Výška koberce 2-3cm
- Pokládka v období IV-X



PROČ TRAVNÍ KOBEREK?

- Hotový trávník během pár hodin
- Bez plevelu a mechu
- Prvotřídní kvalita
- Zátěž již po 3 týdnech od pokládky
- Vzhled



POKLÁDÁME TRAVNÍ KOBEREK

Zakládání nového travního porostu

PŘÍPRAVA PŮDY PŘED POKLÁDKOU :

- Zbavení půdy plevele, kamenů, suti
- Urovnání plochy
- Navezení trávnickového substrátu s příměsí písku, ve vrstvě 10cm, postupně zhutňovat
- Navezený substrát urovnat a dostatečně zalít
- Dorovnat případné nerovnosti
- Před pokládkou opět dostatečně prolít



POKLÁDÁME TRAVNÍ KOBEREC

Renovace stávajícího trávníku

PŘÍPRAVA PŮDY PŘED POKLÁDKOU :

- Použití totálního herbicidu
- Odstranění kamenů
- Starý trávník sloupněte nebo zrotavátorujte do hloubky 12cm
- Pro vylepšení přidejte trávníkový substrát a křemičitý písek
- Plochu urovnat, zhutnit, prolít

POKLÁDÁME TRAVNÍ KOBEREK

V ROVINĚ:

- Pokládat podél delší strany plochy
- Pásy co nejdříve k sobě, ale nepřekrývat
- Pokládat tzv. jako cihly, tedy tak, aby spáry nenavazovaly na sebe
- Přebytečné okraje oříznout ostrým nožem
- Uválcovat šikmo k položeným pásům, zalít

Pokud je nutné vstoupit na položený koberec, použijeme široké prkno.

VE SVAHU:

- Pokládat od vrcholu k úpatí, svisle nebo šikmo
- Pásy lze zajistit dřevěnými kolíky, aby nedošlo k sesunu než dojde k zakořenění
- Dostatečná zálivka



NÁSLEDNÁ PÉČE

- Okamžitě po položení zalít, zálivku opakovat 1-3x denně v menších dávkách po dobu 14 dnů
- První sečení po 10-14 dnech, při výšce trávníku cca 8cm, seč o 1/3 jeho délky
- První hnojení v rovnoměrných dávkách po 3 týdnech od položení, nejlépe dlouhodobě působícím hnojivem
- Před první zimou použít fungicid Amistar, Heritage
- První vertikutace až po 2 letech

ZÁKLADNÍ CHOROBY A OCHRANA

Plíseň sněžná (*Microdochium nivale*)

Projev: po odtání sněhu bělavé až narůžovělé skvrny v trávniku

Příčina: neodklizená organická hmota, sníh, zhutnělá půda, nadbytek N na podzim

Opatření: vyhrabání odumřelé hmoty, přihnojení ledkem vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem

Použití fungicidu při silném napadení:

Amistar, Heritage, Ortiva, Rovral Flo



ZÁKLADNÍ CHOROBY A OCHRANA

Paluška travní (*Typhula incarnata*)

Projev: po sejití sněhu hnědavé až bělavé skvrny v trávníku

Příčina: dlouhodobě ležící sníh, vysoká vzdušná vlhkost

Opatření: vyhrabání odumřelé hmoty, přihnojení ledkem vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem

Použití fungicidu při silném napadení:

Amistar, Heritage, Ortiva, Rovral Flo



ZÁKLADNÍ CHOROBY A OCHRANA

Rez travní a rez korunkatá (*Puccinia graminis*,
P. coronata Corda)

Projev: na listech žluté až rezavé puchýřky, postupné zasychání a odumírání

Příčina: extenzivní sečení, nedostatečná výživa, vysoké teploty a vzdušná vlhkost

Opatření: omezení zálivky, pravidelné hnojení
postřik: Amistar, Heritage



ZÁKLADNÍ CHOROBY A OCHRANA

Kornatka travní (*Laetisaria fuciformis*)

= červená nitkovitost

Projev: většinou na podzim, nepravidelné žluté skvrny v ploše až růžové chomáčky mycelia

Příčina: nedostatek N, vysoká vlhkost

Opatření: pravidelné hnojení, provzdušnění, fungicidy Amistar, Heritage, Rovral Flo



ZÁKLADNÍ CHOROBY A OCHRANA

Čarodějné kruhy (Marasmius oreades)

Projev: tmavě zelené kruhy v trávníku, později výskyt plodnic hub

Příčina: starší trávník, utužená a chudší půda

Opatření: výměna půdy a zasetí nového trávníku, postřik
Amistar, Heritage, Ortiva



VÝŽIVA TRÁVNÍKU

Základní prvky:

N- podpora růstu a regenerace

P- tvorba a růst kořenového systému

K- odolnost vůči suchu a vymrzání

Mg- tvorba chlorofylu

Stopové prvky (**FE, Cu, Mn, S**)- zdravá barva

Aplikace

Granulovaná hnojiva

Kapalná hnojiva

Jarní hnojení

Hnojiva s vyšším podílem N a dlouhodobě působící

1. Hnojení IV

Dále:

2. Hnojení V-VI

3. Hnojení VIII

Podzimní hnojení

Hnojiva s vyšším podílem K

V období IX-X

